

19 de noviembre del 2007

Medicaid recipient's name

[Street address]

[City, state, zip code]

Re: Prueba de sangre para el envenenamiento de plomo

Estimado recipiente de Medicaid:

Medicaid de Nevada quiere que usted sepa que el envenenamiento por plomo puede seriamente afectar la salud de su niño y los niños más pequeños son los más afectados. Una prueba simple puede ayudar a proteger a su niño del envenenamiento por plomo. Esta prueba es GRATIS para los niños que tienen seguro de Medicaid y que son menores de 6 años. (Transportación también puede ser proveída.)

El envenenamiento por plomo sucede cuando una persona ha sido expuesta al plomo y ha absorbido demasiado plomo en la circulación sanguínea. El plomo generalmente entra dentro del cuerpo de dos maneras. La primera manera es por ponerse algo que contenga plomo en la boca. La segunda es por respirar polvo o gases que contengan plomo. Es posible que los síntomas solo aparezcan después de que los niveles peligrosos del plomo se hayan acumulado. La detección temprana a través de una prueba, antes de que los síntomas aparezcan, es mejor para su niño.

Muchas cosas pueden exponer a su niño al plomo. Por ejemplo, el plomo se puede encontrar en:

- Pintura en casas construidas antes de 1978
- Ladrillo de piso
- Tierra o polvo
- Plomería, llaves de agua para tomar
- Dulce que viene de otros países
- Alfarería/cerámica
- Ollas, sartenes, y platos
- Juguetes
- Ropa de trabajo de miembros de la familia que trabajan con baterías de carro, radiadores, o en sitios de construcción

El envenenamiento por plomo es más peligroso para **niños pequeños** puesto que todavía están creciendo y se están desarrollando. El plomo entra dentro de sus cuerpos más fácilmente y más rápido que en los adultos. El envenenamiento por plomo hace difícil el crecimiento y el aprendizaje en los niños. Demasiado plomo en el cuerpo de un niño también puede causar la muerte.

Alrededor de 310,000 niños en los Estados Unidos entre 1 y 5 años de edad tienen envenenamiento por plomo. Algunos niños no tienen ningún síntoma, así que la única forma de saber si su niño está seguro es haciéndole la prueba de sangre.

Medicaid cubre dos pruebas de sangre para detectar plomo en los niños. La primera se debe de hacer a la edad de 12 meses, y la segunda a los 24 meses. Si su niño está entre 24 meses y 6 años de edad y nunca ha tenido la prueba, Medicaid todavía paga para que el o ella tenga una prueba de sangre. Para asegurarse que su niño está seguro, por favor pídale al doctor de su niño esta prueba.

Para preguntas sobre su cobertura de Medicaid de esta y otras pruebas, favor de llamar al () - .

Atentamente,